


Излечимы ли инфекции, передаваемые половым путём?

Вы можете жить полноценной жизнью, зная, что не подвергаете риску жизнь близких людей, т.к. большинство инфекций излечимы, если лечение начато своевременно, адекватно и доведено до конца. При некоторых заболеваниях (генитальный герпес) после соответствующего курса лечения можно добиться длительных периодов без проявления симптомов болезни.



Памятка для населения

ЧТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ОБ ИНФЕКЦИЯХ, ПРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ (ИПП)

Министерство здравоохранения Новосибирской области
ГКУЗ НСО
«Региональный центр медицинской профилактики»
<http://rcmp-nso.ru/>



ИПП – это инфекции, передаваемые половым путем. Наиболее часто встречающиеся: сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, аногенитальные бородавки, генитальный герпес.

Важная информация об ИПП

ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ:

- Преимущественные:

все виды незащищенных сексуальных контактов (вагинальные, оральные, анальные),

- Возможные:

через инфицированную кровь (от матери к ребенку), при несоблюдении правил личной гигиены.

Симптомы ИПП:

Боль или жжение при мочеиспускании, выделения из половых органов, высыпания на коже и слизистых оболочках, НО часто ИПП протекают и бессимптомно.

Самоизлечения при ИПП не бывает, необходимо как можно раньше обратиться к дерматовенерологу, чтобы не возникло осложнений.


При подозрении на ИПП:

- ✓ не отчаиваться,
- ✓ не заниматься самолечением, в том числе по рекомендациям друзей и интернет-ресурсов, а немедленно обратиться к врачу-специалисту.

Как узнать есть ли у Вас ИПП?

Больны ли Вы может определить только врач, проведя необходимое обследование.

Если у полового партнера установлен диагноз ИПП, а у вас нет симптомов заболевания, Вам необходимо обратиться к врачу-дерматовенерологу.



Обследование на ИПП является конфиденциальным (результаты не разглашаются) и включает целый ряд исследований.

Как защититься от ИПП?

1. Строить сексуальные отношения только с одним партнёром, который здоров и верен Вам!
2. Правильно использовать презерватив при каждом половом акте. Это значительно снижает риск инфицирования.
3. Отказаться от рискованного поведения: не употреблять наркотиков и не злоупотреблять алкоголем, так как их действия снижают самоконтроль.